

Respiratorisches

Synzytial


Virus

RSV

Schwere Atemwegsinfektion

Besonders gefährdet:

Alle Säuglinge und Kleinkinder unter 2 Jahren



Empfehlung der STIKO:

Passivimmunisierung
(RSV Saison: Okt-Mär)
Für alle Babys unabhängig
von mögl. Risikofaktoren
in ihrer ersten
RSV Saison

Mit freundlicher
Unterstützung von:
sanofi

 **STIFTUNG
KINDER
GESUNDHEIT**


www.kindergesundheit.de

Übertragung durch



- **Kontaminierte Oberflächen**
(z.B. Türklinken, Spielzeug, Handys)
- **Tröpfcheninfektion**
(Niesen, Husten, Küssen)
- **Händeschütteln**

Symptome




Leichte Symptome:

Erkältungssymptome wie laufende Nase, Husten, Fieber und fehlender Appetit

Schwerwiegende Symptome:

- Husten, Röcheln, Keuchen
- Erschwerte Atmung/Atemnot
- Geweitete Nasenlöcher und/oder Einziehungen im Brustkorb beim Atmen
- Blasse oder bläuliche Haut um Mund oder Fingernägel
- Hohes Fieber



+

+

+

Prävention

+



+

+

- Regelmäßiges und gründliches Händewaschen
- Husten und Niesen in die Armbeuge oder Nutzung von Taschentuch
- Oberflächen, Spielzeuge u.a. Utensilien desinfizieren
- Fernhalten des Säuglings von kranken Personen mit Erkältungssymptomen
- Passivimmunsierung laut STIKO