


BATTERIJ INGESLIKT?

→ VOLG DEZE STAPPEN!



SYMPTOMEN:

Luchtwegobstructie of piepende ademhaling, kwijlen, braken, ongemak op de borst, moeite met slikken, verminderde eetlust, weigering om te voeden, hoesten, verslikken

<6 JAAR

HOOGRISICO-PATIËNTEN

1

<2

Tijd om te handelen!
→ wacht niet op symptomen




<12 uur

(>1jaar) geef na inslikken, om wachttijd te overbruggen, iedere 10 minuten 2 theelepels honing, max. 6x




2




Onmiddellijke endoscopische verwijdering

<12

Diagnose: Röntgenfoto van borstkas, hals en darmen in 2 lagen bij langere voorgeschiedenis of verdenking van plaatsvinden slokdarmlaesie <12u: overweeg CT vóór endoscopische verwijdering.



3



Beoordeling van risicofactoren voor bloedingen

Vorbereiding op **instabiliteit**

4



Intramurale bewaking

Overweeg spoelen met 50 – 150 ml **0,25 % azijnzuur** na verwijdering, als er geen tekenen zijn van perforatie/fistel



#POWERSAFELY is a joint initiative of



European Academy of Paediatrics
Paediatric Section of U.E.M.S

& **DURACELL®**

Supported by

